

Lesión dolorosa en pabellón auditivo

María José Armada Fernández¹, Juan C. Cayuela Prieto², María Consuelo Martínez Barredo³

¹Médico de familia, Centro de Salud de Fingoy, Lugo, ²Médico de familia, Centro de Salud de Monterroso, Lugo. ³Médico de familia Centro de Salud de Sarria, Lugo

Cad Aten Primaria
Año 2010
Volume 17
Páx. 293-293

Mujer de 76 años de edad que acude a la consulta por presentar una lesión ulcerada con fondo costroso, dolorosa en pabellón auditivo de 3 meses de evolución. Con el diagnóstico de sospecha de carcinoma epidermoide, es remitida a cirugía. Tras cuatro meses, cuando la paciente es vista por el cirujano, presentaba una lesión similar en pabellón auricular contralateral, que también fue extirpada y biopsiada.

PREGUNTAS

¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a- Epitelioma
- b- Condrodermatitis nodular de hélix
- c- Queratosis actínica
- d- Tofos



FIGURA 1

Funduscopia de OI evidenciando atrofia generalizada y lesiones pigmentarias antiguas.

Correspondencia

Juan Cayuela Prieto

Email: juan.cayuela.prieto@sergas.es