

Disminución de agudeza Visual en mujer de 28 años

Verónica Rodríguez López¹, Carlos Sevillano Torrado², Verónica Lázaro González³

¹Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Vilagarcía de Arousa, ²Médico especialista en Oftalmología. Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Pontevedra. ³Doctor en Medicina. Médico especialista en Radiodiagnóstico. Servicio de Radiología del Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Cad Aten Primaria
Año 2010
Volume 17
Páx. 292-292

CASO CLÍNICO

Mujer de 28 años que acude a urgencias por presentar fotopsias en ambos ojos de un año de duración y desde hace unos días disminución de agudeza visual (AV) en ojo derecho (OD). Refiere haber recibido tratamiento con prednisona con prednisona oral en dos ocasiones pero no recuerda porqué. Vive con un gato en su casa y presenta un tatuaje en su tobillo izquierdo. Refiere contacto tuberculoso con un familiar de pequeña. La exploración sistémica fue anodina, sin adenopatías ni anomalías en la auscultación. Oftalmológicamente presentaba una AV de 0,2 en OD (OI normal) con el resto de exploración normal salvo dificultad para ver el fondo de ojo; en OI sólo se evidenciaba dispersión pigmentaria (figura 1). La motilidad extrínseca e intrínseca, así como la tonometría, eran normales en ambos ojos.

PREGUNTAS

¿Posibilidades diagnósticas?

- Queratitis por sífilis
- Amaurosis fugax
- Uveítis posterior
- Episcleritis idiopática
- Neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA)




FIGURA 1

Funduscopia de OI evidenciando atrofia generalizada y lesiones pigmentarias antiguas.

Correspondencia

Verónica Rodríguez López.

Centro de Saúde de Vilagarcía de Arousa Avda. das Carolinas s/n, 36600.

Email: vero.riguez@gmail.com