

3.5. ¿Qué hacer para mejorar el vértigo?

El vértigo es una sensación desagradable en la que le parece que las cosas de su alrededor o su propio cuerpo están girando o moviéndose. Suele originarse en el oído. La mayoría de las causas del vértigo no son graves y se resuelven solas y de forma rápida.

El tipo de vértigo más frecuente es el que se llama «**vértigo posicional benigno**».

¿Qué puede hacer?

- Ante una crisis de vértigo hay que descansar en una postura cómoda y evitar los cambios repentinos de posición.
- Si su médico le diagnostica «vértigo posicional benigno», le conviene hacer unos ejercicios que le ayudarán a mejorar: sentado en la cama, con los pies colgando, gire la cabeza un poco hacia un lado y déjese caer hacia el lado contrario hasta apoyar el hombro en la cama. Quédese así 30 segundos y regrese a la posición de sentado. Repita la operación hacia el otro lado. Haga esto 5 veces para cada lado, mañana y noche, durante 1 semana.
- En ocasiones necesitará que los ejercicios sean progresivos:
 - Nivel 1:
 - Mire arriba y abajo cada vez más rápido.
 - Mire a los lados cada vez más rápido.
 - Con el brazo estirado enfoque la mirada en el dedo índice, acérquelo hacia la nariz y aléjelo sin dejar de enfocar.
 - Nivel 2:
 - Mueva la cabeza adelante y atrás con los ojos abiertos cada vez más rápido.
 - Inclíne la cabeza a los lados con los ojos abiertos cada vez más rápido.
 - Cuando lo domine, hágalo con los ojos cerrados.
 - Nivel 3:
 - Haga círculos con los hombros.
 - Gire la cintura a derecha e izquierda.
 - Inclínese hacia delante hasta coger un objeto del suelo, incorpórese y vuelva a dejarlo en el suelo.
 - Gire la cabeza de lado a lado aumentando progresivamente la velocidad. Después hágalo con los ojos cerrados.
 - Nivel 4:
 - Levántese y siéntese en la silla repetidamente.
 - Tire un objeto de mano a mano pasando por encima del nivel de los ojos.



- Pase un objeto de mano a mano por detrás de la rodilla.
- Hasta aquí haga los ejercicios 20 veces. A partir de aquí, repítalos 10 veces.
- Levántese de la silla, dé una vuelta sobre sí mismo y siéntese.
- Nivel 5:
 - Suba y baje de una caja o peldaño. Primero con los ojos abiertos y luego cerrados.
 - Dé vueltas alrededor de una silla. Inténtelo con los ojos cerrados.

¿Cuándo consultar a su médico de familia?

- Cuando sea la primera vez que le ocurre el vértigo.
- Cuando las características del vértigo sean diferentes a episodios anteriores.
- Si oye menos mientras tiene el vértigo.

¿Dónde conseguir más información?

- www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001420.htm
- www.dizziness-and-balance.com/disorders/bppv/bppv-spanish2.htm