

PROTOCOLO ATENCIÓN NO CENTRO DE SAÚDE SOSPEITA COVID-19

Sintomatoloxía de Infección respiratoria aguda

Tose, disnea ou febre (1)

(1) pode ter outros como anosmia, diarrea, mialxias, astenia, cefalea
Se dúbidas tratar como caso posible

PROPORCIONAR MÁSCARA E LUVAS (VINILO BRANCAS)
HIXIENE DE MANS
EVITAR CONTACTO OUTROS PACIENTES E SUPERFICIES



EXEMPLOS:
AUSCULTACIÓN PULMONAR: SE APORTA INFORMACIÓN E POR DETRÁS NUNCA NEBULIZACIÓN (INHALACIÓN CON CÁMARA)

CADRO GRAVE

- Disnea intensa/Cianose
- FR > 25
- Dor pleurítica/hemoptise
- Diminución nivel de consciencia
- Vómitos/diarrea incoercibles
- Hipotensión (TAS < 90- TAD < 60)
- SpO2 < 92%

CIRCUITO DE RESPIRATORIO

CADRO LEVE
SpO2 > 95%
FC < 120
FR < 20

CADRO MODERADO:

- SpO2 92-95%
- FR 20-25
- FC 100-125

NON NEUMONÍA / RX Se disponible / NEUMONÍA

061 TELÉFONO SOMBRA

HOSPITAL

DOMICILIO
Valorar medio transporte (prioritario evitar novos contactos)

VALORACIÓN SOCIAL:
Condições vivenda
Conviventes risco

PROPORCIONAR INFORMACIÓN

CASO
COIDADOR
CONTACTOS

LOCALIZAR CONTACTOS

ORGANIZAR SEGUIMIENTO

ALGORITMO ATENCIÓN TELEFÓNICA

INCAPACIDADE TEMPORAL:

CONFIRMADO: B34.2
POSIBLE/CONTACTO: Z20.828

CONTINXENCIA ENFERMIDADE COMÚN

