

PROTOCOLO ATENCIÓN NO PAC SOSPEITA COVID-19

Sintomatoloxía de infección respiratoria aguda

Tose, disnea ou febre (1)

(1) pode ter outros como anosmia, diarrea, mialxias, astenia, cefalea
Se dúbidas tratar como caso posible

PROPORCIONAR MÁSCARA E LUVAS (VINILO BRANCAS)
HIXIENE DE MANS
EVITAR CONTACTO OUTROS PACIENTES E SUPERFICIES



EXEMPLOS:
AUSCULTACIÓN PULMONAR: SE APORTA INFORMACIÓN E POR DETRÁS NUNCA NEBULIZACIÓN (INHALACIÓN CON CÁMARA)

CIRCUITO DE RESPIRATORIO

CADRO GRAVE

- Disnea intensa/Cianose
- FR>25
- Dor pleurítica/hemoptise
- Diminución nivel de consciencia
- Vómitos/diarrea incoercibles
- Hipotensión (TAS<90-TAD<60)
- SpO2<92%

CADRO LEVE
SpO2>95%
FC<120
FR<20

CADRO MODERADO:

- SpO2 92-95%
- FR 20-25
- FC 100-125

NON NEUMONÍA / RX Se disponible / NEUMONÍA

061 TELÉFONO SOMBRA

HOSPITAL

DOMICILIO
Valorar medio transporte (prioritario evitar novos contactos)

VALORACIÓN SOCIAL:
Condições vivenda
Conviventes risco

PROPORCIONAR INFORMACIÓN

- CASO
- COIDADOR
- CONTACTOS

LOCALIZAR CONTACTOS

ORGANIZAR SEGUIMIENTO

- CONTACTO CON CdS REFERENCIA MÉDICA CABECEIRA
- SOLICITUDE TEST

TEST INDICADO SE:
FACTOR DE RISCO (idade>70)
SANITARIO/SOCIOSANITARIO/
POLICÍA/BOMBEIRO
RESIDENCIAS
EMBARAZADAS
CONTACTO ESTREITO
CASO +

