

# PROTOCOLO ATENCIÓN NO PAC SOSPEITA COVID-19

Sintomatoloxía de infección respiratoria aguda

**Tose, disnea ou febre (1)**

(1) pode ter outros como anosmia, diarrea, mialxias, astenia, cefalea  
**Se dúbidas tratar como caso posible**

PROPORCIONAR MÁSCARA E LUVAS (VINILO BRANCAS)  
HIXIENE DE MANS  
EVITAR CONTACTO OUTROS PACIENTES E SUPERFICIES



**EXEMPLOS:**  
AUSCULTACIÓN PULMONAR: SE APORTA INFORMACIÓN E POR DETRÁS NUNCA NEBULIZACIÓN (INHALACIÓN CON CÁMARA)

**CIRCUITO DE RESPIRATORIO**

**CADRO GRAVE**

- Disnea intensa/Cianose
- FR > 25
- Dor pleurítica/hemoptise
- Diminución nivel de consciencia
- Vómitos/diarrea incoercibles
- Hipotensión (TAS < 90- TAD < 60)
- SpO2 < 92%

**CADRO LEVE**  
SpO2 > 95%  
FC < 120  
FR < 20

**CADRO MODERADO:**

- SpO2 92-95%
- FR 20-25
- FC 100-125

NON NEUMONÍA / RX Se disponible / NEUMONÍA

**061** TELÉFONO SOMBRA  
HOSPITAL

**DOMICILIO**  
Valorar medio transporte (prioritario evitar novos contactos)

**VALORACIÓN SOCIAL:**  
Condicións vivenda  
Conviventes risco

PROPORCIONAR INFORMACIÓN

- CASO
- COIDADADOR
- CONTACTOS

ORGANIZAR SEGUIMIENTO

- CONTACTO CON CdS REFERENCIA MÉDICA CABECEIRA
- SOLICITUDE PCR

